

ĐẶT VẤN ĐỀ

Suy thận là một vấn đề sức khỏe quan trọng và gây tốn kém trong thực hành lâm sàng, vì vậy cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng thuốc. Khi bệnh nhân có suy thận, thời gian bán thải của thuốc được tăng lên, điều đó có nghĩa rằng thuốc sẽ được lưu giữ lâu hơn trong cơ thể và việc sử dụng thuốc ở liều quá cao hoặc liều lặp lại đều có thể dẫn đến sự tích lũy của thuốc gây ra các phản ứng có hại trên đối tượng bệnh nhân này.

Việc điều chỉnh liều phù hợp trên bệnh nhân suy giảm chức năng thận sẽ tối ưu hoá hiệu quả, giảm thiểu độc tính và chi phí điều trị cho người bệnh.

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa là một bệnh viện chuyên khoa, với mô hình bệnh nặng và độ tuổi cao, có nhiều bệnh kèm theo, trong đó không ít bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận, vậy nên hiệu chỉnh liều thuốc cho bệnh nhân suy giảm chức năng thận cần được đặc biệt lưu ý.

Xuất phát từ thực tế trên, khoa Dược đã xây dựng tài liệu: “**Danh mục thuốc cần hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận sử dụng tại bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa năm 2019**” với mục đích giúp các bác sĩ tiện tra cứu và điều chỉnh liều phù hợp cho bệnh nhân. Để biết thêm thông tin và giải đáp thắc mắc, đề nghị các khoa lâm sàng liên hệ với khoa Dược – VTTYT Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa.

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN



BSCKII. Trần Văn Thiết